KANFET ISIUM
8R7s146-150

FH

Kanfet isium

8 R7s146-150









CLOS 8 RANG 7 Souche 146-150

Désignation : Kaufelt isium

CHARGE : Année :

Véraison : 1.8 8

Maturité : 5-9.88 +3

Mill.: 0 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 12 à 17

L - M - C

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 19 x 18

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 f Avec pépins - apyrène

s2 1 JUS : inc. - coloré

s3 2

s4 1

s5 0

ANNEE 1988 mi

NOM Kanfet isium EMPLACEMENT 8 R7 s146 - 150

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 g. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | – | 28.3 | 1 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 28.3 | 1.4 | 2 | 2 | 31.5 | 3.6 | 6.6 | 1.8 | 4.8 | 8.8 | 5.9.88 |
| 4 | 4 | – | 28.3 | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 28.3 | 1.4 | 0 | | | | | | | | |

Pourriture : 0 Port : érigé Vigueur : 2 faible

28.3 +4 3.6 +3 +2 +3

ANNEE 1989

NOM Kanfet isium mi EMPLACEMENT 8 R7 s146-150

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 g | | | | | | | | | | | | |
| 2 g | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 13.3 | 16.3 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 g | | | | | | | | | | | | |
| 5 g | | | | | | | | | | | | |

Pourriture : Mill. : Port : mi érigé Vigueur : 2,5

D le 16.3.89 - 2

ANNEE 1990

NOM Kanfet isium bl mi EMPLACEMENT 8 R7 s 146-150

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | k | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1.3 | 8.3 | 1 | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 1.3 | 8.3 | 0 | 1 | 2 - | 26.5 +6 | 28.5 | 30,7 | 4.8 -1 | 8.8 | 3.9.90 +4 |
| 5 | 2 | 1.3 | 8.3 | 0 | | | | | | | | |

D le 8.3.90 (-1)

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : Vigueur :

revoir s 2

ANNEE 1991

NOM Kanfet isium mi EMPLACEMENT 8 Rg 7 s 146-150

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | | 1 | 2 | 4.6 | 8.6 +8 | 11.6 | 13.8 | 20.8 +4 | 26.8 | 19.9 +5 |
| 2 | 2 | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 3 | | | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |

Grappe : G - (M) - P Dim : 18 Compacité : L - M - (C)

Pour : 1 Mill : 0

Baie : TG - G - (M) - P Dim: 16 x 15

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : 1/2 erigé Vigueur : 2,5

N° d'ordre : Kaufet isium

Désignation : 8RFs-146-150 (s-3)

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 88

N° d'ordre : Kanfet isium

Désignation : 8 R7s. 146-150 (s.148)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -

séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.

sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo86

N° d'ordre : Kaufet isium
Désignation : 8 R7o-146-150 (s.2)
Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.
Face inférieure : nervures : glabre 144 ou - séteux 145 très légt. - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.
limbe : glabre 150 ou - séteux 151 très légt. - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.
Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.
Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.
Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.
Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.
Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.
Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.
Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.
Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.
Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 88

N° d'ordre :
Désignation : Kanfet isium
Emplacement : 8 R7 s-146-150(s-3)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 13 à 17 x).
Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 21 x 20 ).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore 105 - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.
A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.
A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.
A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 88

DENOMINATION : Kanfet isium
EMPLACEMENT : 8 R7 s 146. 150 (n.5)

## SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....11..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : Kanfet isium

Emplacement : 8 R 7 s 146 - 150

| | |
|---|---|
| Angle des nervures | : 1 - 2 - 3 |
| Sexe | : 4 - 5 - 6 |
| $L_1/L_2$ | : 7 - 8 - 9 |
| $L_2/L$ | : 10 - 11 |
| Nombre de lobes | : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |
| Prof. sinus latéral Sup. | : 17 - 18 - 19 - 20 |
| Prof. sinus latéral Inf. | : 21 - 22 - 23 - 24 |
| Forme sinus pétiolaire | : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 |
| Fond sinus pét. ni en U ni en V | : 266 |
| Sinus pétiolaire ouvert | : 267 |
| Dent au fond du sinus pétiolaire | : 30 |
| Forme sinus latéral Sup. | : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 |
| Fond sinus latéral Sup. en V | : 268 - en U : 269 - autre : 270 |
| Sinus latéral Supérieur ouvert | : 271 |
| Dents : forme | : 40 - 41 |
| Dents (angle) | : 42 - 43 - 44 |
| Angle du lobe terminal | : 45 - 46 - 47 |
| Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.) | : 48 - 49 - 50 |
| Nbre dents du point pét. à $L_3$ | : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 |
| Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ | : 60 - 61 - 62 |
| Largeur du sinus pétiolaire | : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 |

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90